

# Snapshot®

SPECIALTY HERBICIDE

## Ya no se dañe la espalda desmalezando a mano. Ahorre tiempo y dinero.

Eficaz para estas malezas:



Poa annua  
(Espiguilla)



Bittercress  
(Berro amargo)



Chickweed  
(Hierba de pollo)



Crabgrass  
(Zacate amargo)



Dandelion  
(Diente de león)




Henbit  
(Ortiga de Henbit)



Oxalis  
(Agritos)



Spurge  
(Lechosilla)



Según las malezas que tenga que controlar, aplíquelo siguiendo las proporciones de uso de la etiqueta:

**2.3-4.6 LIBRAS POR CADA 1,000 PIES CUADRADOS**


### APLICACIÓN EXTERNA SOBRE PLANTAS ORNAMENTALES



DE CULTIVO EN TIERRA




DE CULTIVO EN MACETAS



**1/2 y 1/2**

Aplique la mitad del producto en una dirección y la otra mitad en dirección perpendicular



HASTA **4 A 6 MESES DE CONTROL**

SEGÚN LAS CONDICIONES



**1/2 ACTIVAR CON AL MENOS 1/2 PULGADA DE AGUA DE LLUVIA O RIEGO**

El herbicida especializado Snapshot® se adhiere firmemente a las partículas del suelo y tiene baja solubilidad en agua, por lo que se une con firmeza a la zona de aplicación.



**3 DÍAS**

DEBE LLOVER O USTED DEBE REGAR EN UN PLAZO DE 3 DÍAS PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS

Equipo de protección personal requerido

- ✓ Camiseta de mangas largas
- ✓ Pantalones largos
- ✓ Calcetines
- ✓ Zapatos

